

## Voltaren Emulgel 1% żel 50 g

Cena: 36,26 pln



### Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	100 g (tuba)
Postać	żel
Producent/ Dystrybutor	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum natricum
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Działanie i zastosowanie**Lek Voltaren Emulgel 1% jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę. Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel 1% wykazuje również działanie kojące i chłodzące. **Lek działa** przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. **Stosowany jest w miejscowym leczeniu Dorośli i młodzież powyżej 14 lat** pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń) bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. **Dorośli (powyżej 18 lat)** ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Sposób użycia i dawkowanie** Voltaren Emulgel 1% należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Voltaren Emulgel 1% (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia obszaru o powierzchni około 400 cm<sup>2</sup> do 800 cm<sup>2</sup>. Po zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym. **Nie należy stosować leku dłużej niż** dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwreżenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgienu dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem. **Skład** Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku. 100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku. Inne składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbolpol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45), woda oczyszczona.